

## Productividad laboral en una cohorte local de pacientes con artritis reumatoide.

C Santos-Ramírez<sup>1</sup>, J Rosas<sup>2</sup>, JM Senabre<sup>2</sup>, G Santos-Soler<sup>2</sup>, X Barber<sup>3</sup>, E Salas<sup>2</sup>, M Sánchez-Barrioluengo<sup>4</sup>, N Llahí<sup>5</sup>, C Cano<sup>5</sup>. Reumatología, Hospital de Denia<sup>1</sup> y Hospital Marina Baixa, Villajoyosa<sup>2</sup> (Alicante). CIO-UMH de Elche<sup>3</sup>, INGENIO (CSIC-UPV) Universitat Politècnica de València<sup>4</sup> y Enfermería de Reumatología<sup>5</sup>, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante).

**Objetivo.** Evaluar los datos de productibilidad laboral de los pacientes de un registro local de pacientes con artritis reumatoide.

**Material y métodos.** Se analizan los datos de 303 pacientes de un registro local de pacientes con artritis reumatoide (AR) diagnosticados desde enero 2006 a diciembre de 2011, en la Sección de Reumatología del Hospital Marina. Se evalúan los datos de productividad laboral a través de los cuestionarios WPAI:AR (WPAI:AR V2.0; Spanish version). De los 303 pacientes incluidos, se dispone de la información sobre productibilidad laboral de un total de 133 pacientes.

**Resultados.** De los 133 pacientes: el 36% son trabajadores en activo, el 24% amas de casa, el 34% son jubilados y el 5% parados. La media de horas trabajadas de los pacientes con AR laboralmente activos es de 33 horas a la semana. Con una pérdida media de 1.7 horas semanales debido a problemas relacionados con su AR respecto a 4 horas en relación a otra causa. En una escala analógica visual sobre afectación de la AR en la productividad laboral (del 0 al 10: 0 implica nula afectación y 10 impedimento completo), la media de la puntuación fue de  $2.5 \pm 3$  horas a la semana.

| WPAI:AR  | Media | Desviación típica | Mediana |
|--|-------|-------------------|---------|
| Horas de trabajo perdido a la semana por AR                        | 1.68  | 7.01              | 0       |
| Horas de trabajo perdido a la semana debido a cualquier otra causa | 4.19  | 10.88             | 0       |
| Horas realmente trabajadas   | 33.44 | 19.03             | 40      |
| Afectación de la productividad laboral                             | 2.52  | 2.93              | 2       |
| Afectación para realizar las actividades diarias                   | 4.22  | 3.22              | 4       |

**Conclusiones.** 1. El 36% de los pacientes de los que se conocen datos de productividad laboral de CoAR-SVR son trabajadores activos. 2. La AR supone una disminución de la productividad laboral, con una pérdida media de 1.7 horas de trabajo semanales.

Palabras clave: Artritis Reumatoide. Estudio cohortes. Productividad laboral.